

**7 класс. Задача 3.
Критерии ответов.**

Задача 3.1. Поверхностный сток.

Факторы, которые влияют на величину поверхностного стока		
1	Малое количество осадков на большей части материка – <i>1 балл</i>	
2	Высокие значения испарения – <i>1 балл</i>	
3	Рыхлость горных пород, их большая водопроницаемость в пределах Центральной Австралии – <i>1 балл</i>	
Бассейны стока рек Австралии		
60%	33%	7%
Области внутреннего стока – <i>1 балл</i>	Индийский океан – <i>1 балл</i>	Тихий океан – <i>1 балл</i>


Итого 6 баллов

Задача 3.2. Речной сток. По 1 баллу за правильно заполненную ячейку

№	Индекс климатограммы	Тип климата	Время года, когда реки полноводны
1	<i>А</i>	<i>Субэкваториальный</i>	<i>лето</i>
2	<i>В</i>	<i>Тропический восточных побережий или тропический муссонный</i>	<i>круглый год / большую часть года</i>
3	<i>Д</i>	<i>Субтропический с равномерным увлажнением</i>	<i>круглый год / большую часть года</i>
4	нет	<i>Тропический континентальный</i>	<i>никогда</i>
5	<i>Г</i>	<i>Субтропический средиземноморский</i>	<i>зима</i>
6	<i>Б</i>	<i>Тропический континентальный</i>	<i>никогда</i>

Итого 17 баллов

Задача 3.3. Типы растительности и районы их распространения.

1	45%	<i>пустыни – 1 балл. Центральные и западные районы Австралии в области распространения тропического континентального климата – 1 балл.</i>	
2	22%	<i>леса – 1 балл. Восточное побережье Австралии в области тропического влажного климата, юго-западные и южные районы Австралии с субтропическим средиземноморским климатом, Тасмания, часть полуостровов Арнемленд и Кейп-Йорк – 2 балла.</i>	

3	33%	<i>саванны и редколесья – 1 балл. Север Австралии в области субэкваториального климата, западные и южные районы, окаймляющие пустыни – 1 балл.</i>	
----------	------------	--	--

Итого 7 баллов

Максимальная сумма – 30 баллов.

